



¿Cuándo derivar al dermatólogo? Criterios prácticos para mejorar la resolutividad en APS

Trabajos de Investigación

Resolutividad en Atención Primaria

Valeria Caracci Quilodrán^{1, 2}, Pía Navarrete Maltez^{1, 2},
María Lucía Álvarez García^{1, 2}.

(1) CESFAM El Manzano, Santiago, Chile.

(2) CESFAM Peñaflor, Santiago, Chile.

luciaalvarez0908@gmail.com

Introducción

La derivación oportuna y eficiente a dermatología es fundamental para optimizar recursos y evitar demoras diagnósticas. Esta revisión identifica criterios prácticos, desde la evidencia y la experiencia clínica, para guiar mejor las decisiones de derivación desde la APS.

Metodología

Revisión de guías clínicas nacionales e internacionales y artículos sobre derivación dermatológica desde APS. Se sintetizaron criterios comunes y se estructuró una tabla resumen con los principales motivos y umbrales razonables de derivación.

Resultados

Se estructuró tabla con criterios de derivación para patologías frecuentes: lesiones pigmentadas, eccemas resistentes, sospecha de cáncer, entre otros. Se propone fortalecer resolución local y capacitar en herramientas diagnósticas simples como dermatoscopia básica.

Conclusiones

El uso de criterios claros y sistemáticos para derivación dermatológica puede reducir derivaciones innecesarias, acortar tiempos de atención especializada y mejorar la calidad resolutive de la APS.

Palabras Clave

(1) dermatología, (2) derivación, (3) criterios.

Financiamiento:

Autofinanciado